
	PO 05 AMB PERCORSO DEL PAZIENTE AMBULATORIALE
	MO04 PO05 ENDO PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DI EGDS rev. 06 del 13.01.2020



Ambulatorio di Endoscopia Digestiva
Tel. 0421/338442
Da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Reparto Chirurgia 0421/338430-431
24h/24h

PREPARAZIONE

- osservare il **diggiuno** dalla mezzanotte (almeno 6 ore prima) per gli esami eseguiti al mattino, dal mattino per quelli eseguiti nel pomeriggio. Si può bere liquido chiaro (acqua, the zuccherato, camomilla, ecc NO LATTE) fino a 2 ore prima
- assumere terapia farmacologica standard fino al giorno prima, no la mattina dell'esame
- sospendere farmaci IPP/protettori gastrici (Pantorc, Antra, etc) almeno due settimane prima dell'esecuzione dell'esame. Può assumere antiacidi (Maalox, Riopan, Gaviscon)
- per l'eventuale terapia antidiabetica (insulina/orale) far riferimento al paragrafo dedicato
- per l'eventuale terapia anticoagulante far riferimento al paragrafo dedicato

COSA PORTARE

- impegnativa per esofagogastroduodenoscopia
- documentazione relativa ad altri problemi di salute
- documentazione di esami precedenti con eventuali referti istologici se disponibili

IN OSPEDALE

- l'utente sottoposto a EGDS in sedazione deve essere accompagnato da una persona in grado di fornire e ricevere informazioni relative allo stato di salute dell'utente, in grado di poter attendere fino alla fine dell'esame e di poter condurre un veicolo
- l'ora di esecuzione dell'esame può essere diversa da quella dell'appuntamento
- ultimata la gastroscopia si dovrà rimanere in osservazione presso i locali dell'endoscopia digestiva per circa 30 minuti
- i farmaci sedativi **eventualmente** usati durante l'esame possono causare sonnolenza. La guida di veicoli e firma di documenti non è pertanto opportuna per almeno **24 ore**

A CASA

- osservare il digiuno per almeno un'ora dalla fine dell'esame e poi cominciare ad alimentarsi regolarmente
- se venissero eseguiti prelievi bioptici mantenere il digiuno per 1 ora e mezza dopo l'esecuzione dell'esame, poi cominciare a bere liquidi tiepidi e dopo 4 ore cominciare ad alimentarsi
- gli **eventuali** prelievi eseguiti durante la gastroscopia possono causare un leggero sanguinamento; se feci picee (nero carbone), il paziente deve chiamare e presentarsi per una visita di controllo.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Terapie farmacologiche:

Anticoagulante o antiaggregante: il paziente deve rivolgersi al proprio curante per la sospensione di tale terapia e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva. Oppure consultare il paragrafo specifico sul nostro sito

Altre condizioni:

- **Patologie cardiache, cirrosi epatica, trattamento dialitico** devono essere segnalate al personale sanitario preventivamente
- **Diabete mellito insulino dipendente e non:** non eseguire alcuna dose di insulino terapia o compressa orale, mantenere il digiuno assoluto, all'occorrenza si può assumere un thè dolce o un cucchiaino di miele (portare con sè l'insulina)

 CASA DI CURA SILENO ED ANNA RIZZOLA	PO 05 AMB PERCORSO DEL PAZIENTE AMBULATORIALE
	MO04 PO05 ENDO PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DI EGDS rev. 06 del 13.01.2020

- **Gravidanza e allattamento:** sospetta gravidanza o allattamento dovranno essere segnalati al personale sanitario.

Il referto e l'eventuale proseguimento terapeutico verranno consegnati direttamente dal medico successivamente all'esecuzione della gastroscopia.

In caso di dubbi sulla preparazione o su altre indicazioni per l'esecuzione dell'esame non esitate a contattarci ai numeri sopraindicati.